



FUNDACIÓN
CRECIENDO CON ALERGIAS

PLAN DE ACCIÓN ANAFILAXIA

Nombre

Contacto emergencia

Teléfono

Contacto emergencia

Teléfono

Diagnóstico

Auto-inyector Epinefrina / Dosis

Médico

SIGNOS DE ALERTA

NO RESPIRA BIEN

INFLAMACIÓN lengua, párpados, labios, cara.

DESMAYO mareos

NÁUSEAS dolor abdominal intenso

RONCHAS y picazón generalizada

APLIQUE AUTO-INYECTOR



1 retire el seguro azul



2 aplique fuertemente
contra el muslo

3 Posición del paciente

- Después de administrar el auto-inyector, recueste al paciente sobre su espalda, con las piernas ligeramente elevadas.
- Si el paciente tiene dificultad para respirar, puede preferir estar sentado
- Si el paciente presenta náuseas o vómitos, recuéstelo de lado.

TRASLADÉ AL PACIENTE AL SERVICIO DE URGENCIA SIEMPRE

Artículo 494 n°14 del Código Penal

Constituye falta penal no prestar auxilio a una persona que se encuentra en una emergencia médica de riesgo vital evidente.

Plan de acción Anafilaxia

Revisado por la Sociedad Chilena de Alergias e inmunología y por el comité médico de Creciendo con Alergias Marzo 2022



Sociedad Chilena
de Alergia
e Inmunología

www.creciendoconalergias.cl

PLAN DE ACCION 2022